

KIT DE PREPARACIÓN SUTAB

Instrucciones de Preparación Intestinal — Dosis Dividida

★ RÉGIMEN DE DOSIS DIVIDIDA — Comience la 2.ª dosis exactamente 7 horas antes de su procedimiento. NADA POR VÍA ORAL (incluida el agua) a partir de 5 horas antes de su procedimiento. Confirme sus horarios exactos con nuestro equipo de programación. ★

✓ LÍQUIDOS CLAROS PERMITIDOS	✗ NO PERMITIDOS
Caldo colado de pollo, res o verduras	Sopas cremosas; sopa de arroz, huevo o fideos
Café negro, té negro (sin leche/crema)	Leche o crema no láctea
Bebidas gaseosas y no gaseosas	Batidos, licuados de proteína
Gatorade, Pedialyte, PowerAde	Jugo de tomate
Kool-Aid u otras bebidas con sabor a fruta	Jugo con pulpa (naranja/torónja)
Jugo de manzana, arándano blanco o uva blanca	Nada de color rojo o morado
Gelatina (Jell-O), paletas de hielo (no rojas/moradas)	

PREPARACIÓN DE DOSIS DIVIDIDA: SUTAB (2 dosis de 12 tabletas)

- ¡MANTÉNGASE HIDRATADO! Beba suficiente agua para reponer lo que pierda durante la preparación.
- ¡PERMANEZCA CERCA DEL BAÑO! Puede comenzar a tener evacuaciones en tan solo 30 minutos.
- **NO siga las instrucciones de la caja/envase de SUTAB — siga este horario proporcionado por el consultorio.**

Noche Anterior al Procedimiento — DOSIS 1

- 6:00 PM: Abra el 1.er frasco de 12 tabletas.
- Llene el envase provisto con 16 oz de agua. Trague cada tableta con un sorbo de agua y beba toda el agua en un lapso de 15–20 minutos.
- Aproximadamente 1 hora después de la última tableta, llene el envase nuevamente con 16 oz de agua (hasta la línea de llenado) y bébala por completo.
- Beba al menos dos envases más de 16 onzas de agua durante la siguiente hora.
- Continúe bebiendo líquidos claros hasta la hora de dormir.

Día del Procedimiento — DOSIS 2

- **Comience la Dosis 2 exactamente 7 horas antes de la hora programada de su procedimiento.**
- Abra el 2.º frasco de 12 tabletas y repita los mismos pasos de la Dosis 1: 16 oz de agua con las tabletas en 15–20 minutos, luego otras 16 oz una hora después.
- **Beba al menos dos envases más de 16 onzas de agua después, terminando todos los líquidos a más tardar 5 horas antes de su procedimiento. NADA POR VÍA ORAL — incluida el agua — después de ese momento.**
- Si presenta síntomas relacionados con la preparación (náuseas, hinchazón o cólicos), pause o reduzca la velocidad de ingesta del agua adicional hasta que los síntomas disminuyan.

ESTARÁ LISTO PARA SU PROCEDIMIENTO CUANDO:

- | | |
|---|---|
| ☐ Haya leído y seguido todas las instrucciones. | ☐ Sus evacuaciones sean un líquido amarillo claro, como orina, y pueda ver el fondo del inodoro. |
| ☐ Haya completado TODA la solución de preparación. | ☐ Haya organizado y confirmado que alguien lo lleve a casa. |

Llame al 770-995-3113 si tiene problemas al tomar la preparación O si sus evacuaciones no son un líquido amarillo claro.